

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ OXYGENATOR

Για **εγκαταστάσεις** χωρητικότητας ως 5 τόνους ύλης

Οδηγίες

1. Βάλτε 50 γρ OXYGENATOR σε **πλαστικό δοχείο** με 15 λίτρα **χλιαρό νερό** (20⁰C -30⁰C).
2. Περιμένετε 20 λεπτά.
3. Αδειάστε (ή ψεκάστε) το διάλυμα ώστε να καλύψει την επιφάνεια του υλικού.

Σημ. 1 **Μην χρησιμοποιήσετε μεταλλικά** δοχεία, σκεύη ή άλλα **μεταλλικά** εργαλεία κατά την παρασκευή του διαλύματος

Σημ. 2 Σε φρεσκοκομμένο χόρτο, λόγω της ζύμωσης η θερμοκρασία ανεβαίνει πάνω από τους 60° C, γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε το διάλυμα **μετά** την πέμπτη μέρα.

Σημ. 3 Μετά από την εφαρμογή του διαλύματος συνιστάται **μόνο μια** ανάδευση τις επόμενες 2-3 ημέρες.

Σημ. 4 Το κομπόστ **ολοκληρώνεται** τις επόμενες 8-10 εβδομάδες και είναι έτοιμο προς χρήση..

Σημ. 5 Τα υλικά για κομποστοποίηση πρέπει να διατηρείται πάντα **υγρό**.

Σημ. 6 Η κομποστοποίηση πρέπει να ξεκινάει σε εξωτερικές θερμοκρασίες **πάνω** από +10° C.